

دندان های
شیری






نام گذاری دندان های شیری



EDCBA	ABCDE
EDCBA	ABCDE

نمای رو برو





نام گذاری دندان های شیری



بالا راست کودک

بالا چپ کودک

EDCBA ABCDE


EDCBA ABCDE

پایین راست کودک

پایین چپ کودک



شناسنامه سلامت دهان و دندان



شناسنامه سلامت دهان و دندان

کودکان مهدکودگی

شهرستان: نام مهد کودک:

نام و نام خانوادگی کودک: تاریخ تولد:

ثبت وضعیت دندان ها

سن	وضعیت دندانها	عادات غلط دهانی و موارد خاص	تاریخ	معاينه کننده
تا ۲ سالگی	☐ سالم ☒ رویش نیافته ☐ پوشیده	۱. مکیدن انگشت ۲. مکیدن پستانک ۳. شکاف لب ۴. شکاف کام ۵. پسوردگی (پورس دندانها) ۶. تغییر در رپش		
۳ تا ۳ سالگی				
۳ تا ۴ سالگی				
۴ تا ۵ سالگی				
۵ تا ۶ سالگی				

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت سلامت
اداره سلامت دهان و دندان

سازمان بهزیستی کشور
دفتر امور کودک و نوجوان



معاینه دهان و دندان



بررسی نمای ظاهری صورت



تورم

تغییر رنگ



عدم تقارن





وسایل مورد نیاز جهت معاینه و فلوراید تراپی توسط دندانپزشک



آینه

وارنیش فلوراید

رول پنبه

پنس

سوند معاینه





معاینه دهان و دندان توسط دندانپزشک



آینه

سوند

نور
کافی





وسایل مورد نیاز جهت معاینه و فلوراید تراپی توسط مربی بهداشت



آبسلانگ

وارنیش فلوراید

گاز یا دستمال کاغذی





معاینه دهان و دندان توسط مربی بهداشت





آبسلانگ

چراغ قوه



وارنیش فلورايد






با توجه به رسوب فلوراید،
قبل از استفاده توسط برس
محلول به هم زده شود
تا قوام یکنواخت حاصل گردد





کاربرد مجدد
هر ۴ تا ۶ ماه یکبار
وارنیش فلوراید
جهت دستیابی به فوائد ضد پوسیدگی آن
ضروری است





ملاحظات قبل از انجام وارنیش فلوراید




۲

کودک مسواک زده
و دندان ها تمیز باشند

۱

بهتر است کودک صبحانه
صرف کرده باشد





ملاحظات پس از وارنیش فلوراید



۳

وارنیش فلوراید غالباً باعث
تغییر رنگ دندان به رنگ
زرد می‌گردد که بتدریج در
عرض ۲۴ ساعت برطرف
می‌شود

۲

بیمار تا صبح روز بعد نباید از
مسواک یا نخ دندان
استفاده کند تا وارنیش
بیشترین فرصت را جهت
تماس با دندان داشته باشد

۱

حداقل تا ۸ ساعت از
خوردن غذاهای داغ و سفت
(نظیر سیب و هویج و....)
باید اجتناب شود





